



# АРХІВ ПСИХІАТРІЇ

Георгій Леонідович народився 11 травня 1923 р. в Сімферополі в сім'ї інженера лісового господарства. У дитинстві жив у Криму, потім – у Сибірі, на Кавказі, у Москві, а в 1940 р. переїхав до Києва. У червні 1941 р. закінчив середню школу та майже наступного дня після випускного вечора був призваний до Червоної Армії. Бойові дії закінчив у званні гвардії-сержанта артилерії навесні 1945 р. в Берліні, де брав участь у форсуванні ріки Шпре, штурмі Рейхстагу, Рейхканцелярії та будівлі Мофтваффе. Після цього, у складі особливого збірного батальйону всіх фронтів був переведений до Москви для участі в Параді перемоги, на якому виконав почесну місію низверження фашистського прапора дивізії «Мертва голова» до мавзолею на Червоній площі. Нагороджений орденами Вітчизняної війни I та II ступенів, орденом Слави III ступеня, великою кількістю медалей.

Повернувшись після демобілізації до Києва, Г.Л. Воронков у 1947 р. вступає до Київського медичного інституту. З вересня 1953 р. навчається у клінічній ординатурі на кафедрі психіатрії медінституту. В 1957 р. – обирається за конкурсом на посаду асистента кафедри психіатрії, через рік (1958) захищає кандидатську дисертацію з електроенцефалографії при інсулінотерапії шизофренії, а у 1962 р. Г.Л. Воронкову присвоєно звання доцента. В 1972 р. завершує та успішно захищає докторську дисертацію на тему «К проблеме дебютов и ранней диагностики эпилепсии».

«Достоїнством Георгія Леонідовича було те, що він як справжній вчений зумів створити свій напрям у науці, який отримав визнання спеціалістів, а також те, що він продовжував розвивати ідеї свого вчителя Я.П. Фрумкіна» (І.Д. Шевчук).

З 1975 р. Г.Л. Воронков завідував кафедрою психіатрії Київського медичного університету. В 1977 р. йому присвоєно звання професора. 18 років професор Г.Л. Воронков був головним психіатром МОЗ України, з 1978 до 1987 року – головою Республіканської проблемної комісії зі спеціальності «психіатрія».

Перу Г.Л. Воронкова належить понад 90 наукових праць, серед них: «Учебный атлас психиатрии» (1962), учбовий посібник «Психиатрия. Таблицы и схемы» (1977), два видання «Справочник врача-психиатра» (1981, 1990) тощо. Під його науковим керівництвом захищено 2 докторські та низка кандидатських дисертацій. З 1991 до 1992 року Г.Л. Воронков працював на посаді професора кафедри Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Помер у серпні 1992 року.



З 1975 по 1991 роки кафедрою психіатрії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця завідував доктор медичних наук, професор Г.Л. Воронков.



Професор Г.Л. Воронков





## ЦИПРАЛЕКС – оптимальное сочетание эффективности и переносимости в лечении депрессии и тревожных расстройств<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Cipriani et al. Lancet. 2009; 373: 746–758

**Торговое название** – Ципралекс.  
**Регистрационное свидетельство** № UA/8760/01/01, Приказ МЗ Украины № 533 от 21.06.2013.  
**Состав:** 1 таблетка содержит 12,77 мг эсциталопрама оксалата, соответственно – 10 мг эсциталопрама.  
**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой.  
**Фармакотерапевтическая группа:** антидепрессанты. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). АТС N06A B10.  
**Категория отпуска:** по рецепту врача.  
**Показания:** лечение больших депрессивных эпизодов, панических расстройств с или без агорафобии, социальных тревожных расстройств (социальная фобия), генерализованных тревожных расстройств, обсессивно-компульсивных расстройств.  
**Противопоказания:** повышенная чувствительность к эсциталопраму или другим компонентам препарата, одновременное лечение неселективными необратимыми ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО) или пимозидом.  
**Побочные реакции:** расстройства кроветворной и лимфатической систем: тромбоцитопения. Расстройства иммунной системы: анафилактические реакции. Расстройства эндокринной системы: нарушения секреции антидиуретического гормона. Расстройства

питания и обмена веществ: снижение или повышение аппетита, увеличение или уменьшение массы тела, гипонатриемия, анорексия. Психические расстройства: тревога, беспокойство, аномальные сны, снижение либидо у мужчин и женщин, аноргазмия у женщин, скрежет зубами, возбуждение, нервозность, панические атаки, спутанность сознания, агрессия, деперсонализация, галлюцинации, мания, суицидальные мысли, суицидальное поведение. Расстройства нервной системы: бессонница, сонливость, головокружение, парестезия, тремор, нарушение вкуса, нарушения сна, обморок, серотониновый синдром, дискинезия, двигательные расстройства, судороги, психомоторное беспокойство/апатия. Зрительные нарушения: расширение зрачка, затуманенность зрения. Слуховые расстройства: звон в ушах. Сердечные расстройства: тахикардия, брадикардия, удлинение интервала QT на ЭКГ. Сосудистые расстройства: ортостатическая гипотензия. Респираторные нарушения: синуситы, зевота, носовое кровотечение. Желудочно-кишечные нарушения: тошнота, диарея, запор, рвота, сухость во рту, желудочно-кишечные кровотечения. Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит, изменение функциональных печеночных проб. Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: усиленное потоотделение, высыпания, облысение, крапивница, зуд, синяки, отеки. Скелетно-мышечные нарушения:

артралгия, миалгия. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: задержка мочеиспускания. Нарушение репродуктивной системы и грудных желез: расстройства эякуляции, импотенция, метроррагия, меноррагия, галакторея, приапизм. Общие расстройства: утомление, пирексия, отек.  
**Фармакологические свойства:** эсциталопрам является антидепрессантом, селективным ингибитором обратного захвата серотонина, что обеспечивает клинический и фармакологический эффекты препарата. Он обладает высокой аффинностью к основному сайту связывания и смежному с ним аллостерическому сайту транспортера серотонина и не имеет совсем или имеет очень слабую способность связываться с рядом рецепторов, включая серотониновые 5-HT<sub>1A</sub>-, 5-HT<sub>2</sub>-рецепторы, дофаминовые D<sub>1</sub>- и D<sub>2</sub>-рецепторы, α<sub>1</sub>-, α<sub>2</sub>-, β-адренергические, гистаминовые H<sub>1</sub>-, мускариновые холинергические бензодиазепиновые и опиатные рецепторы.  
**Производитель:** Х. Лундбек А/С, Дания.  
Полная информация о лекарственном средстве содержится в инструкции по медицинскому применению.  
**Информация о лекарственном средстве для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников.**

Представительство Лундбек Экспорт А/С в Украине:  
г. Киев, 01001, ул. Крещатик, 19 а,  
тел. (044) 490-29-10, факс (044) 490-29-11.  
www.lundbeck.com



### Скорочена інструкція для медичного застосування препарату Респолепт Конста®

**Склад:** 1 флакон містить рисперидону 25 мг, 37,5 мг, 50 мг (1 г мікрогранул містить 381 мг рисперидону).

**Лікарська форма.** Порошок для приготування суспензії пролонгованої дії для внутрішньом'язових ін'єкцій.

**Фармакотерапевтична група.** Антипсихотичні засоби. Код АТС N05A X08.

**Показання.** Підтримуюча терапія для лікування шизофренії у пацієнтів, стабілізованих пероральними антипсихотичними засобами.

**Протипоказання.** Виражена гіперчутливість до рисперидону або до будь-якого іншого компонента препарату.

**Спосіб застосування та дози.** Див. Інструкцію для медичного застосування.

**Діти.** Препарат Респолепт Конста® не застосовують дітям віком до 18 років внаслідок недостатності даних щодо безпеки та ефективності препарату.

**Побічні реакції.** Стосовно повного профілю безпеки препарату — див. Інструкцію для медичного застосування. Побічні реакції, які спостерігалися найчастіше (частота >1/10): безсоння, страх, головний біль, інфекції верхніх дихальних шляхів, паркінсонізм, депресія та атаксія.

**Упаковка.** Система з безголковим пристроєм Alaris™ Smart Site®. Один флакон з порошком, що містить мікрогранули пролонгованого вивільнення Респолепт Конста®. Один заповнений у заводських умовах шприц з розчинником 2 мл. 1 безголковий пристрій Alaris™ Smart Site® для приготування суспензії. Одна голка Needle-Pro® (із захисним пристроєм) для внутрішньом'язової ін'єкції.

**Категорія відпуску.** За рецептом.

# Рисполепт **КОНСТА**®

РИСПЕРИДОН

ПЕРВЫЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ АТИПИЧНЫЙ АНТИПСИХОТИК

### Перед призначенням слід ознайомитися з повною інструкцією для медичного застосування.

Реєстраційне посвідчення МОЗ України № UA/1683/01/01, UA/1683/01/02, UA/1683/01/03 від 07.08.2009 по 07.08.2014 терміном на 5 років.  
ID PHUA/RIC/0913/0001a

Текст складено у відповідності з Інструкцією для медичного застосування, яку затверджено МОЗ України 07.08.2009 зі змінами від 04.10.2013.

За додатковою інформацією звертайтеся за адресою:  
04070 м. Київ, вул. Спаська, 30;  
тел. (044) 490 64 64, факс (044) 490 64 65.

Рисполепт Конста — торгова марка, власність групи компаній Johnson&Johnson

©Johnson&Johnson 2012

