

Поширеність вживання наркотиків та ПАР в Україні

2014-2021*

* Дані до 2014 року навмисно не включено, оскільки ці дані охоплювали території АР Крим, м. Севастополя та частини Донецької та Луганської областей, які з 2014 року окуповані Російською Федерацією.

Загальна інформація

ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. **На урядовому рівні** Україна не проводить спеціальних досліджень поширеності вживання наркотиків серед населення.

2. Вживання наркотичних речовин серед молоді віком 15-17.

З 1995 року в рамках міжнародного проекту “European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” (ESPAD) регулярно проводиться опитування учнівської молоді. Останні дані цього опитування відносяться до [2019 року](#).

3. Вживання наркотичних речовин серед вікової групи 15-64 років.

Спеціальні дослідження на урядовому рівні не проводилися.

4. Вживання наркотичних речовин серед груп високого ризику

Спеціальні дослідження на урядовому рівні не проводилися.

ПРОТЕ:

Незважаючи на відсутність досліджень, ми можемо аналізувати та оперувати даними, зібраними від суб'єктів моніторингу відповідно до [Постанови КМУ «Питання проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні» від 10 липня 2019 року № 689!](#)

Збір даних

За показником поширеності вживання наркотиків, найбільш достовірним джерелом збору даних в Україні, що відповідають рекомендаціям EMCDDA, є:

Форма № 32 «Контингент та лікування осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин».


Примітки:

- Дані публікуються на сайті [Центру медичної статистики МОЗ України](#).
- Інші наявні форми звітності на кшталт [Фформи 10](#) не релевантні для оцінок та аналізу та ілюстрації ситуації згідно з рекомендаціями EMCDDA.
- За формою-32 аналізуються кількісні дані щодо осіб, які звернулися до закладів охорони здоров'я за лікуванням та взяті під нагляд.
- Попередні зусилля Центру моніторингу наркотиків, спрямовані на розробку Уніфікованої форми, яка б на 100% відповідала рекомендаціям EMCDDA, не принесли бажаних результатів через певні інституційні складнощі.

Класифікація даних за Формою 32


<p>1. Демографія</p> <p>✓ <u>Вікові групи:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 0-17• 15-35• 18+ <p>✓ <u>Місце проживання:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Сільське населення• Міське населення	<p>2. Групи речовин</p> <p>✓ <u>Речовини</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Опіоїди• Канабіноїди• Кокаїн• Галюциногени (в т.ч. ЛСД)• Кілька речовин• Інші (в т.ч. ефедрон) <p>✓ <u>Інші психостимулятори (крім алкоголю)</u></p>
<p>3. Перебування під наглядом</p> <p>✓ <u>Усього на кінець звітного періоду (Поширеність)</u></p> <p>✓ <u>Взято під нагляд з уперше встановленим діагнозом: (Захворюваність)</u></p>	<p>4. Форма лікування</p> <p>✓ <u>Профілактична група</u></p> <p>✓ <u>Диспансерна група:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Амбулаторне• Стаціонарне• Примусове у закладах МОЗ• Примусове у ВТУ

Поширеність* вживання ПАР за речовиною (осіб)




* Поширеність – загальна кількість осіб, що перебувають на лікуванні на кінець звітної періоду

Поширеність вживання ПАР за речовиною (%)




Захворюваність* вживання ПАР за речовиною (осіб)



* Захворюваність – кількість осіб, яких було взято під нагляд з уперше встановленим діагнозом у звітному періоді («нові пацієнти»)


Захворюваність вживання ПАР за речовиною (%)



Поширеність вживання ПАР за віковими групами (осіб)

Усі речовини


Поширеність вживання ПАР за віковими категоріями (осіб)



Поширеність вживання ПАР за віковими групами (%)


Усі речовини

Поширеність вживання ПАР за віковими категоріями (%)



Захворюваність вживання ПАР за віковими групами (осіб)


Усі речовини



Захворюваність вживання ПАР за віковими групами (%)

Усі речовини

Захворюваність вживання ПАР за віковими категоріями (%)



Поширеність вживання ПАР за місцевістю (осіб)


Усі речовини

Поширеність вживання ПАР за місцевістю (осіб)



Поширеність вживання ПАР за місцевістю (%)

Усі речовини



Захворюваність вживання ПАР за місцевістю (осіб)


Усі речовини

Захворюваність від вживання ПАР за місцевістю (осіб)




Захворюваність вживання ПАР за місцевістю (%)

Усі речовини




Диспансерне лікування за формою лікування (осіб)

Усі речовини



Диспансерне лікування за формою лікування (%)

Усі речовини




Опіюїди


Опіюїди

2021 рік:


Поширеність*
42 711
Вперше в житті**
2 684



Опіюїди




Опіюди




Опіюди

Поширеність вживання опіюдів за місцевістю (%)



Опіюди

Захворюваність від вживання опіюдів за місцевістю (%)



Канабіноїди

Каннабіноїди


2021 рік:

Поширеність

4 811


Вперше в житті**

274




Канабіноїди

Поширеність вживання канабіноїдів за віком (%)




Канабіноїди




Канабіноїди

Поширеність вживання канабіноїдів за місцевістю (%)



Канабіноїди

Захворюваність від вживання канабіноїдів за місцевістю (%)



Кокаїн

Кокаїн


2021 рік:

Поширеність


270

Вперше в житті**


6



Кокаїн




Кокаїн




Кокаїн

Поширеність вживання кокаїну за місцевістю (%)



Кокаїн

Захворюваність від вживання кокаїну за місцевістю (%)



Кілька речовин

Кілька речовин


2021 рік:

Поширеність*


16 633

Вперше в житті**

1 093



Кілька речовин




Кілька речовин




Кілька речовин

Поширеність вживання кількох речовин за місцевістю (%)



Кілька речовин

Захворюваність від вживання кількох речовин за місцевістю (%)



Інші психостимулятори (крім алкоголю)

Інші


психостимулятори 2021 рік:

Поширеність*


1 616

Вперше в житті**

148



Інші психостимулятори (крім алкоголю)




Інші психостимулятори (крім алкоголю)



Інші психостимулятори (крім алкоголю)

Поширеність вживання інших стимуляторів крім алкоголю за місцевістю (%)



Інші психостимулятори (крім алкоголю)

Захворюваність від вживання інших стимуляторів крім алкоголю за місцевістю (%)

